

Tájékoztató MMR védőoltás esedékességéről

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. és 15. §-a alapján)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogynevű gyermeke

MMR emlékeztető védőoltásra kötelezett.

Az oltás helye: az Állami Népegészségügyi Szolgálat illetékes Kistérségi Intézete által kijelölt oltóhely (HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény orvosi rendelő)

Az oltás időpontja: várhatóan tanévkezdéskor ősszel

Oltást végző orvos: Dr. Borda Stefánia

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás alól betegsége miatt végleges mentessége van, kérjük, szíveskedjen haladéktalanul igazolni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül, többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

Fontos, hogy még az oltás előtt tájékozott legyen! A védőoltással kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

✂.....✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy a dTap védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen való megjelenésről szóló értesítést megkaptam és átvettem:

Dátum:.....

.....
Gyermek neve

.....
Szülő aláírása

KÉREM AZ ALÁÍRT PÉLDÁNYT AZ ISKOLAVÉDŐNŐNEK ELJUTTATNI!

Milyen védőoltás az MMR (Morbilli=Kanyaró, Mumps=Járványos fültőmirigy gyulladás, Rubeloa=Rózsahimlő)? A kötelező védőoltás első oltását Magyarországon minden kisdéd 15 hónaposan kapja. A tartós védettség kialakításához 11 éves korban (illetve 6. osztályban) az oltás ismétlésére van szükség. A védőoltás hatására ellenanyagok termelődnek a szervezetben, melyek megvédnek a betegségtől.

Ki nem kaphat MMR oltást? Lázás, beteg gyermek nem oltható. Immunhiányos állapotban (daganat ellenes kezelés, veleszületett immunhiány) az oltóanyagban lévő gyengített vírusok is betegséget tudnak okozni. Immunglobulin pótlás vagy vérkészítmények az oltás védőhatását csökkentik. Terhes nők nem olthatók.

Milyen mellékhatása lehet az MMR oltásnak? Az oltóanyagban gyengített élő kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusok vannak. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat az immunrendszerre. Ennek megfelelően, a 7-14. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább. 1 millió oltott közül egynél léphet fel súlyosabb szövődmény, agyvelőgyulladás formájában.

A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. A tünetek tartós fennállása esetén haladéktalanul jelentkezni kell a háziorvosnál!

A felmerülő kérdésekre szívesen adunk felvilágosítást az oltásokat megelőzően hétfőnként 8-9 óráig személyesen az iskolai egészségügyi szobában.

Kádár Ágnes

iskolavédőnő

Dr. Borda Stefánia

iskolaorvos